

Características clínicas y supervivencia de cáncer de pulmón localizado

» Pedro Luis Ramos Guette¹

¹ Oncocare

Objetivo: el cáncer de pulmón es la primera causa de incidencia y mortalidad en el mundo. Principal: el propósito de este estudio es describir la supervivencia global de cáncer de pulmón localizado.

Secundarios: 1. describir la supervivencia libre de enfermedad del cáncer de pulmón localizado; 2. describir las características críticas y demográficas del cáncer de pulmón localizado.

Materiales y métodos: se trata de un estudio observacional descriptivo retrospectivo de pacientes con cáncer de pulmón atendidos en la Clínica Oncocare durante el periodo del 1º de enero de 2005 al 31 diciembre de 2019. Se realizaron análisis descriptivos usando medidas de tendencia central, ubicación y dispersión para las variables continuas, y frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas. Se construyeron curvas de supervivencia por el método de Kaplan-Meier.

Resultados: se identificaron 94 pacientes con una edad promedio de 64.6 años rango 30 a 88, sexo femenino 49 (52.1 %), estado clínico IA:10 (10.6 %), IB:12 (12.8%) IIA:5 (5.3 %), IIB:58 (61.7 %), IIIA:8 (8.5 %), histología de adenocarcinoma 56 (63.6 %), escamo celular 11 (12.5 %), células grandes 13 (14.8 %), neuroendocrino 5 (5.7 %), células pequeñas 1 (1.1 %), carcinoma no especificado 1 (1.1%), adenocarcinoma in situ 1 (1.1%), sin información 2. A la recaída los sitios de metástasis fueron: cerebro 10 (16.1 %), ósea 19 (30.6 %), pleura 5 (8.1 %), pulmón 17 (37.4 %), hígado 6 (9.7 %), metástasis únicas 38 (61.3 %), metástasis en dos o más sitios 23 (37.1 %). Tabaquismo 46 (48.9 %), estado funcional 0-1: 90 (95.7 %), régimen de seguridad social subsidiado 75 (83.3 %). Recibieron tratamiento adyuvante 83 (88.3 %), los esquemas más frecuentemente utilizados fueron carboplatino paclitaxel 50.7 %, cisplatino pemetrexed 21.4 %, cisplatino vinorelbine 19.6 %.

La supervivencia media libre de recaída fue de 49 meses, la supervivencia media global fue de 52.4 meses; la tasa de mortalidad fue de 72 (76.6%).

Conclusión: los pacientes con cáncer de pulmón localizado a pesar de ser una enfermedad en general tratable con cirugía, la recaída y mortalidad siguen siendo elevadas y obligan a buscar nuevas estrategias para mejorar su pronóstico.

Autor para correspondencia: Pedro Luis Ramos Guette, Oncocare.

Correo electrónico: pramos152@yahoo.com

Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)

Palabras Clave

Cáncer pulmón; supervivencia; localizado; adyuvancia-

Figuras y tablas

Figura 1. Supervivencia global cáncer pulmón localizado.

