

## Supervivencia cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo

» Pedro Luis Ramos Guette<sup>1</sup>

» María Athenas Ramos Escalante<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Oncocare

**Objetivos:** en Colombia el cáncer de mama es primero en incidencia con 13.380 (14.01 %) casos nuevos y se presentaron 3.702 (8.79 %) muertes; corresponde a la tercera causa de mortalidad por cáncer. General: describir las supervivencias globales de las pacientes con cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo. Específicos: 1. describir la supervivencia libre de progresión de las pacientes con cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo; 2) describir las características clínicas y demográficas de las pacientes con cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo.

**Materiales y métodos:** se trata de un estudio observacional descriptivo retrospectivo, se realiza con la información de la Clínica Oncocare en el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2016 hasta el 30 diciembre de 2020. Se incluyeron todas las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo; se hace una descripción de las características clínicas y demográficas con estadística descriptiva medidas de tendencia central y dispersión y se construyen curvas de supervivencia por el método Kaplan-Meier.

**Resultados:** un total de 36 pacientes fueron identificados en el estudio, la edad promedio fue de 60.8 (rango 46-74) años; la presentación inicial metastásica fue recaídas en 30 (83.3 %), sitios metástasis visceral 20 (55.6 %), sistema nervioso central 4 (11.1 %), no visceral 16 (44.4 %), un solo sitio de metástasis 18 (50.0 %), dos o más sitios de metástasis 18 (50.0 %), postmenopáusicas 24 (70.6 %). Estado funcional ecog 0-1: 32 (88.9 %), pertenecen al régimen subsidiado 30 (83.3 %), tipo histológico ductal infiltrante 32 (88.9 %), tipo luminal B 20 (55.6 %). Reciben tratamiento de primera línea con palbociclib letrozol 20 (55.6 %) y ribociclib letrozol 16 (44.4 %).

A una mediana de seguimiento de 25.5 meses la supervivencia media libre de progresión es de 16.4 meses y supervivencia media global no se ha alcanzado, se ha presentado una frecuencia de muertes de 33.3 %.

**Autor para correspondencia:** Pedro Luis Ramos Guette, Oncocare.

**Correo electrónico:** pramos152@yahoo.com

Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND.  
(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)


**Conclusión:** en los pacientes con cáncer de mama metastásico receptor hormonal positivo tratado con inhibidores de ciclinas se describe una supervivencia libre de progresión que se asemeja a los datos publicados en la literatura. Se necesita un seguimiento mayor y tamaño de muestra con mayor número de pacientes para conclusiones definitivas.

### Palabras Clave

Cáncer de mama; metástasis; supervivencia; pronóstico.

### Figuras y tablas

**Figura 1.** Supervivencia global cáncer mama metastásico receptor hormonal positivo.



**Figura 2.** Supervivencia libre de progresión cáncer mama metastásico receptor hormonal positivo.

