

Incidencia, manejo y evolución de los pacientes con trombocitopenia primaria inmune tratados en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz durante el período 2014-2016

► Daniela Cordero, Andrés Moreno, Mario Quintero

Hospital Universitario Erasmo Meoz (Norte de Santander, Cúcuta)

Introducción: la trombocitopenia primaria inmune (TPI) es un trastorno autoinmune caracterizado por un recuento plaquetario menor a $100 \times 10^9/l$, con exclusión de otras patologías que causen trombocitopenia. Objetivo: determinar la incidencia de pacientes con TPI en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz y evaluar su evolución con el esquema de tratamiento elegido.

Materiales y métodos: es un estudio descriptivo-retrospectivo, fueron seleccionados los casos con código CIE-10: D693. Se identificaron 146 pacientes, cuyas historias clínicas fueron revisadas, analizando las variables: sexo, edad, trimestre de ingreso, plaquetas al ingreso y egreso, tipo de TPI, leucocitos y hemoglobina, pródromo, síntomas, manejo, respuesta al tratamiento, efectos secundarios y recidiva; 102 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión.

Resultados: la incidencia de TPI en el período de estudio fue del 0,0892%. Se encontró que la relación por sexo fue de 1 hombre por cada 1,5 mujeres; la mediana de edad fue 17 años; el 17,6% de los pacientes presentó pródromos de la enfermedad; el 69,6% tuvo compromiso de piel y mucosas. El 75,5% de los pacientes se registraron como TPI de reciente diagnóstico. En cuanto al tratamiento, el 59,8% recibió corticoides como monoterapia; el 26,4%, corticoides en combinación con transfusión, inmunoglobulina o ambos; el 2,9%, inmunoglobulina en monoterapia; el 1%, inmunoglobulina y transfusión; y el 9,8% no recibió tratamiento. La respuesta al tratamiento de primera línea fue completa en el 46,1% de los casos, parcial en el 43,1% y resistente en el 10,8%. La mortalidad fue del 0%.

Conclusiones: la incidencia de TPI en el período de estudio fue del 0,0892%. Se encontró que la relación por sexo fue de 1 hombre por cada 1,5 mujeres. La respuesta al tratamiento de primera línea fue completa en el 46,1% de los casos, parcial en el 43,1% y resistente en el 10,8%. La mortalidad fue del 0%.

DATOS DE CONTACTO

Correspondencia: Daniela Cordero. Correo electrónico: danielasanchez110407@hotmail.com